

Borderline, personlighetsstörningar, ökad sjuklighet och ökad dödlighet

**Emma Björkenstam
Charlotte Björkenstam
Lisa Ekselius**

Svenska Psykiatrikongressen 14 mars 2012



**UPPSALA
UNIVERSITET**

 **Socialstyrelsen**
THE NATIONAL BOARD OF HEALTH AND WELFARE


Bakgrund

- Cirka 6 – 13 % av vuxna befolkningen uppskattas ha en personlighetsstörning
- Hur ser vårdutnyttjandet ut i slutenvård?
- Finns skillnader mellan kön, åldersgrupper?
- Förändringar de senaste 10 åren?
- Mortaliteten hos de som sjukhusvårdats?
- Skillnader i mortalitet mellan kvinnor och män?



Vårdtillfällen per 100 000 invånare

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen




UPPSALA
UNIVERSITET


 **Socialstyrelsen**
THE NATIONAL BOARD OF HEALTH AND WELFARE

Diagnosfördelning

Kvinnor, 18-34 år



Män, 18-34 år




Kluster A (F60.0-F60.1): Paranoid, Schizoid, Schizotypal

Kluster B (F60.2-F60.4): Antisocial, Borderline, Narcissistisk, Histrionisk.


Kluster C (F60.5-F60.7): Fobisk, Osjälvständig, Tvångsmässig




LPT-vård bland patienter vårdade för personlighetsstörningar




Andel av alla vårdade med personlighetsstörning som vårdas frivilligt resp. med tvång (LPT)




Totalmortalitet bland kvinnor och män 18-34 år, uppdelad på patienter med personlighetsstörning och totalt för gruppen 18-34 år per 100 000




Själv mord bland kvinnor och män 18-34 år, uppdelad på patienter med personlighetsstörning och totalt för gruppen 18-34 år per 100 000




Genomsnittligt antal vårdtillfällen de sista 5 år innan självmord



Andel av alla självmord där patienterna någon gång har vårdats för personlighetsstörning de sista 5 år innan självmordet



Andel av alla självmord år 2010 där personerna vårdats för personlighetsstörning det sista året




Sammantaget visar resultaten att

- Vårdutnyttjandet för unga kvinnor har ökat de senaste tio åren
- Samma minskning ses inte för unga män
- Unga män vårdas i hög utsträckning för ospecificerad PS
- Tvångsvård för PS är cirka 4 - 5 ggr vanligare hos unga kvinnor jämfört med motsvarande åldersgrupp hos män
- Dödligheten är väldigt mycket högre i den här patientgruppen än i totalbefolkningen
- En stor andel av den förhöjda dödligheten utgörs av självmord
- Bland unga kvinnor som begår självmord har en högre andel tidigare vårdats för personlighetsstörning än bland män




Andel av vårdtillfällen för personlighetsstörningar där samtidig missbruksdiagnos rapporterats



Vårdtillfällen per 100 000 invånare

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen



UPPSALA
UNIVERSITET

Kön	Death year	Period for hospitalization	Suicide, 18-34	Antal vårdade (som vid mätpunkt för död var 18-34)	Antal vårdtillfällen bland de i E	Antal döda som vårdats	Antal vtf senaste fem åren innan död	Genomsnittligt antal vtf fem åren före död
Men	2001	1997-2001	220	1 151	2 731	8	19	2,4
Men	2002	1998-2002	239	1 126	2 438	12	20	1,7
Men	2003	1999-2003	191	1 043	2 225	2	10	3,3
Men	2004	2000-2004	210	1 037	2 099	5	15	3,0
Men	2005	2001-2005	192	1 014	1 922	11	40	3,6
Men	2006	2002-2006	186	1 025	1 935	8	13	1,6
Men	2007	2003-2007	222	986	1 980	4	8	2,0
Men	2008	2004-2008	234	1 000	1 935	5	11	2,2
Men	2009	2005-2009	201	987	1 903	7	9	1,3
Men	2010	2006-2010	235	1 049	2 029	5	9	1,8
Women	2001	1997-2001	56	1 986	6 777	5	20	4,0
Women	2002	1998-2002	79	1 993	6 564	11	31	2,8
Women	2003	1999-2003	94	2 004	6 568	8	53	6,6
Women	2004	2000-2004	71	2 062	6 895	9	95	10,6
Women	2005	2001-2005	87	2 227	7 522	13	53	4,1
Women	2006	2002-2006	86	2 395	8 361	12	38	3,2
Women	2007	2003-2007	65	2 563	9 278	10	98	9,8
Women	2008	2004-2008	87	2 743	10 112	11	117	10,6
Women	2009	2005-2009	72	2 939	10 684	11	93	8,5
Women	2010	2006-2010	75	3 043	11 229	17	140	8,2

RESERV BILD

